

Rawling: The Great Plateau, p. 174.

"Their bodies were always thickly covered with grease and fat, but the more exposed parts suggested strongly that the lama had recently completed the sweeping of a chimney or the cleaning out of a stone-hole."

Rawling, p. 181.

Sa-fa Dzong was not visible until we were almost upon it. Though a fort by name, it is only so called by courtesy, and because the official in charge is entitled to the rank of "fort commander". It is, however, a place of considerable importance, not so much from its size as that it is regarded as the center of a very large district.

Sa-fa is a straggling village of about twenty-five mud-brick houses built under the shelter of a low ridge, and on a mound lying just above the level of the plain. All around lies marshy ground with numerous pools of water and, as a consequence, a plentiful supply of grass. It is one of the regular changing places (to-sam) which lie at intervals of three or four marches for the entire distance between Garlok and Lhasa.

The northern route followed by Bailey and Wood - heavy and stony. Many passes to cross. Scanty population.  
The southern route followed by Rawling and Ryder was found better.

p. 241.

These nomads were a wild, unkempt, dirty-looking lot, their long matted hair hanging in rolls or filthy pig tails down their backs, or blowing out in streamers in the wind.

dead and withered grass.

Riang. *Equus hemionus*.

Wild Yak (*Bos grunniens*)

Tibetan Antelope (*Pantholops hodgsonii*)

Tibetan Gazelle (*Gazella pecticaudata*).

Nyan (*Ovis Ammon*.)

Wolf (*Canis laniger*)

Tibetan Hare (*Lepus hispidus*).

11 1928

11 1928

Trans-Himalayas by Sven Hedin, vol. I & II, 1910.

2

longitudinal valleys.

p. 140 horses fed with yak and sheep flesh.

Lam lung - height - 16,000 ft.

Poy-chen La (17,621 ft)

Table -

Trans-Himalayas - peripheral regions.

The short, lofty, meridional range, which is called Tarkö-gang-ri, and is rather to be considered an isolated massive, ends in the north not far from the lake, the flanks of the last peak descending gently to its flat plain. It was impossible to make soundings as we had no boat with us, and the ice not firm enough to walk on it, as many of the lakes were already breaking up.

at  $\text{འཕགས་ལྗོངས་$  hot spring north of Gyegon-La (18,012 ft).

at the surface has a temperature of 93.6°.

visited by Sven Hedin.

The Gyegong La is situated in the  $\text{འཕགས་ལྗོངས་$ , which is distinctly marked chain.

$\text{འཕགས་ལྗོངས་$  on a height of 17,037 ft.

green porphyry on the northern side of Sangmo-La.

base of Soma-tsang-po is flat and shallow

$\text{འཕགས་ལྗོངས་$  is 15,367 ft.

Sangmo-La S. Hedin 1908 1905.

Угел Криваванский обрывает для Мидетта Сальману 3  
Женедизина (От Каштан да ужом Усеюй Реки, р. 6)

Кебкхотинице собственых зубуных, дабы как можно  
меньше находится в зависимости от туземцев.

Угел ичиги -  
агунаки кривоводы  
позже кривоводы агунаки, которые растут вил или кривоводы,  
Болонис, широко расселенные породы; пирокши, и  
агунаки словенскими заг и широким лант.

Белая береза, сосна, лиственница, река береза  
Керман, осина и кедр.

Угелы Кундуй, IV от Грив - долине агунаки.

Древниное пашови - кривоводы агунаки вонусканы  
ирениковими долинами (Кривар - Кундуй).

Бого-уга-лиственница, сосна, ели и  
пихты.

Угел (Antelope gutturosa)

Колонды кривоводы (они 3-7 футов).

*Ovis Darvini*.

Весна - июль агунаки Грив. Самцы спускают виллы года  
для Монгольской Грив - осень (Конец - Август - Октябрь).

Пашоване ревера агунаки

Коранни кривоводы (Caccabis chukar).

Куну-агунаки (Pseudois Notoor)

опонро (A. Hodgsoni) | себесунь ~~Федотубей~~  
ада (A. picticauda)

Дайскунь рауки (Monedula dauvica)

Хуань (Asinus Kiang) -

Мубескунь явороуки (Melanocorypha  
maxima)

муусыда (Lagomys ladacensis) ормене.

О муусыда, Угубаскунь; Дт Ракмань на  
кентуки Угундонь Рескунь - сунь. 125 - 129 -

---

Всичко кенасеке инеа кыртань ржаолунне  
однаков, и сунь нокорам сунь окуауденни  
амисофери.

---

Муньнань (Casarca sutile)

Сакнань (Phalacrocorax carbo).

---

Кесунь но муань Махунь -  
Мехунь жанадке муньдунь Нгунтунь - 'тсо  
и Тунгунь - Сунтунь.

Мубескунь мекхунь (Ursus lagomyiarius)

Хажунь, Будапунь -

---

Кесунь (Primula rivalis var. farinosa).

Дукунид - (*Prophagus multus* n. sp.).

4

Мидежский толк (*Canis chankoy*) -

Пигрошеваре зуревин (*Felis nigricollis*)

мидежская оока (*Bobacia*)

кабарга (*Moschus sifanica* n. sp.)

марбаран (*Arctomys robustus*).

ворон (*Corvus corax*) -

Пржевальский, 1880,

Кравчинский, Кавказская маньчжур-каш геше самое, зюи у прорих оно их собраний. Канцество и северие, ридан с пробостью, мавно, Коркестью и доуном - вот отмириженый серты характера представлений этого писателя. Тубитво и привязанности к людям близким, проявляет у нас, корянуи, не более, чем и у многих зубодовых откошувельно себе подобных. Богачество или власть, частью удаць и сила физическая - единственные здесь критерии достоинства человека.

Уч аозе промис е фея пор как вшии кемисант этии сита, а кафтава кравчинском ситрас коввинков сетуо-вождомо мидеж мамо

уменьшились. Правда, восточнее еще по северу,  
и многие концы найдены знаменитыми  
Россетовыми русскими 3-х летней, Карлтонский  
Мангера и Маннхера, но правосторонне Карлтон  
остались еще.

---

угод (Крипа ерорс)